

愛，不滋病

愛滋防治暨性平教育宣導

同志諮詢熱線 南部辦公室

社群發展部主任 李奇紘

想到愛滋病

人人都聞風喪膽

多重性伴侶

吸毒

死亡

之症

性交易

不治

亂交不

轟男同志

我們會不斷勸誡別人

不要得愛滋病、用各種方式建立恐懼

效果仍然非常有限

那到底怎麼做才是最有效果的呢？

聯合國世界衛生組織 強調

愛滋病是全世界
必須共同正視的疾病

2030目標 95-95-95

95%的人知道自己已經感染

95%的感染者接受治療開始服用HAART(雞尾酒療法藥物)

95%的接受治療感染者體內的病毒量都呈現為測不到

ONE can't fit ALL


防治策略必須因地制宜

那我們就來看看台灣的現況吧

全國HIV感染(含母子垂直感染疑似個案)本國籍趨勢圖(1984年-2019年)



[診斷日 1984/01/01-2019/12/31]



2006、2018都明顯下降了

就來討論發生甚麼事情了吧！

等等.....


好像要先知道怎麼才會傳染吧

沒有高風險族群，只有高風險行為

HIV (人類免疫病毒)
AIDS (後天免疫缺乏症候群)

感染HIV會引發AIDS

HIV感染者的歷程



在發病之前 只是HIV感染者

體內的免疫系同還是無異於一般人

母子垂直

媽媽是感染者，懷孕的過程中傳染給子女

2018年CDC宣布愛滋寶寶零新增

共用針具

藥癮者的靜脈注射共用針具&醫護人員的針扎風險

危險性行為

沒有使用保險套的肛交、陰道交

2005年 藥癮者清潔針具提供計劃

用三個使用過的針具去衛生所換一個全新針具

社會輿論 警政與司法的挑戰

提供清潔針具=鼓勵吸毒?

警察埋伏在衛生所附近抓人

成效斐然 在這之後的反思

一味的用恐嚇式的教育效果有限
多元、減害的觀點才能更有效的促進防治成效

2016年 PrEP暴露前預防性投藥計畫

PrEP 暴露前預防性投藥

PEP 暴露後預防性投藥

其實就是.....事前、事後避孕藥的概念

多一個方式，多一個保護

PEP 暴露後預防性投藥

行之有年，在風險行為後的72H內進行投藥
連續服用28天，即可達到預防效果

PrEP 暴露前預防性投藥

最新科技，日常服用(每日一顆)、
任務型服用 (性行為前4小時2顆，後兩日各1顆)
即可有效預防

預防愛滋病 不只有保險套

社會大眾又開始說
提供PrEP=鼓勵約炮

除了這些策略 零歧視、去汙名、多關懷

才是更加重要的幕後推手

你有聽過MSM族群

Man have Sex with Man與男同性戀的差別？

CDC不再用汙名的方式 進行疫情的宣導與更新

標籤化只會讓感染者躲得更加深遠

將男同性戀與愛滋病去連結

還沒有感染的你 有聽過恐愛症嗎？

與未感染的人息息相關
你會害怕被感染HIV嗎？

性交易、性道德的鬆綁

感染者的就醫困境

感染者的告知義務(?)

預防性投藥補助 納健保與否？

預防是否勝於治療

我的觀點

只有讓愛滋病、HIV可以被好好地談論，
才能讓這個疾病被妥善的控制，迎來終結的一天。